

# Harvest More®

5-5-45 20-20-20 30-10-10



- Es una línea de fertilizantes concentrados en polvo 100% solubles para ser usado en aplicaciones foliares y riego tecnificado.
- Contiene en un solo producto los macronutrientes y micronutrientes necesarios para un óptimo desarrollo de la planta.
- Se encuentra disponible en tres formulaciones, corrigiendo problemas causados por carencia de uno o más nutrientes.

## Composición Química

|                        | N   | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O |
|------------------------|-----|-------------------------------|------------------|
| HARVEST MORE® 30-10-10 | 30% | 10%                           | 10%              |
| HARVEST MORE® 5-5-45   | 5%  | 5%                            | 45%              |
| HARVEST MORE® 20-20-20 | 20% | 20%                           | 20%              |

La línea de productos HARVEST MORE® contiene además:

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Calcio (Ca)    | 0,05  | % |
| Magnesio (Mg)  | 0,05  | % |
| Azufre (S)     | 1     | % |
| Hierro (Fe)    | 0,1   | % |
| Cobre (Cu)     | 0,05  | % |
| Molibdeno (Mo) | 0,005 | % |
| Manganeso (Mn) | 0,05  | % |
| Zinc (Zn)      | 0,1   | % |
| Boro (B)       | 0,02  | % |
| Cobalto (Co)   | 0,002 | % |

Valores expresados en  
% peso / peso

La fuente de Nitrógeno de la línea HARVEST MORE® es Amónica. Los micronutrientes metálicos de la línea HARVEST MORE® están quelatizados con EDTA.

## INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 30-10-10

Fertilizante con alto contenido de Nitrógeno, que mediante aspersiones foliares o al sistema de riego, promueve un rápido crecimiento vegetativo, en especial en cultivos que fueron sometidos a estrés (sequía, heladas, plagas, etc.).

| CULTIVO                                                                                                                                                        | DOSIS                 | APLICACIÓN                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manzano, Peral, Kiwi, Naranja, Pomelo, Limonero, Mandarino, Palto, Almendro, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Nogal, Duraznero, Damasco, Olivo, Uva de mesa y Vides | 3-5 Kg / ha           | 1º Al inicio de brotación. Repetir según necesidades.                                                  |
| Tomates y Hortalizas en general                                                                                                                                | 0,5-1 Kg / 100 L agua | 1º Al inicio de brotación/floración, repitiendo en distintos momentos de la temporada según necesidad. |
| Frutillas, Frambueso y Arándano                                                                                                                                | 3 Kg / ha             |                                                                                                        |
| Papa                                                                                                                                                           | 3-5 Kg / ha           | 3 - 4 hojas en adelante o entre 5 a 10 cm. de altura. Repetir según necesidad.                         |
| Nabo                                                                                                                                                           | 3-5 Kg / ha           | 3 - 4 hojas en adelante. Aplicar al final del ciclo vegetativo para alargar éste.                      |
| Raps                                                                                                                                                           | 3-5 Kg / ha           | Desde 4 hojas en adelante.                                                                             |
| Trigo                                                                                                                                                          | 3-4 Kg / ha           | Desde macolla en adelante o según necesidades del cultivo.                                             |
| Pradera                                                                                                                                                        | 2-4 Kg / ha           | Aplicar 3-7 días después del talajeo. Aplicar con STIMULATE 200-300 cc / ha.                           |
| Maíz                                                                                                                                                           | 3-5 Kg / ha           | Aplicar desde 5 - 6 hojas en adelante. Repetir a los 15 días.                                          |

## INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 5-5-45

Fertilizante formulado con un alto nivel de potasio, diseñado para ser usado en aspersiones foliares o vía riego tecnificado. Se recomienda su utilización en las etapas de fructificación, pues moviliza los azúcares desde las hojas a los órganos de cosecha.

| CULTIVO                                                                             | DOSIS                        | APLICACIÓN                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manzano, Peral, Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Damasco, Nectarino, Uva de Mesa y Viñas | 3-5 Kg/ha                    | Aplicar a inicios de pinta y repetir a los 10-15 días.                                                                                        |
| Nogal                                                                               | 3-5 Kg/ha                    | Aplicar en crecimiento activo de frutos y repetir 30 días antes de cosecha.                                                                   |
| Kiwi                                                                                | 3-5 Kg/ha                    | Aplicar 40-30 días antes de cosecha y repetir 15 días después.                                                                                |
| Almendro                                                                            | 3-5 Kg/ha                    | Aplicar 30 días antes de cosecha.                                                                                                             |
| Naranja, Pomelo, Limonero, Mandarino                                                | 5-8 Kg/ha                    | Aplicar en fruto cuajado y repetir a los 15 días. Se recomienda hacer 2-3 aplicaciones durante crecimiento estival de frutos (Enero a Marzo). |
| Olivo                                                                               | 4 Kg/ha                      | Aplicar 45 y 30 días antes de cosecha. Se recomienda aplicar junto a SUGAR MOVER (4L/ha).                                                     |
| Palto                                                                               | 12 Kg/ha                     | Aplicar en marzo en conjunto con Sugar Mover.                                                                                                 |
| Hortalizas en general                                                               | 400-500 gr / 100 L de agua   | 20-30 días antes de cosecha.                                                                                                                  |
| Tomates                                                                             | 450 - 550 gr / 100 L de agua | Aplicar con primer racimo pintón y repetir a los 20 días. Se recomienda aplicar junto a SUGAR MOVER (250 cc/100L).                            |
| Frutillas, Frambuesos y Arándanos                                                   | 2-3 Kg/ha                    | Aplicar cada 7-10 días desde fruto cuajado hasta cosecha.                                                                                     |
| Papas                                                                               | 3-5 Kg / ha                  | Desde llenado de tubérculos en adelante. Se recomienda aplicar junto a NITRATE BALANCER (3 L/ha).                                             |
| Alfalfa                                                                             | 3-5 Kg/ha                    | Aplicar 10 días después de cada corte. Se recomienda aplicar junto a STIMULATE 0,5 - 1 L/ha.                                                  |

La línea de productos HARVEST MORE ® deberá ser utilizada considerando las necesidades específicas de cada cultivo y su época de aplicación estará en función de las mayores necesidades de estos nutrientes durante el ciclo de crecimiento. HARVEST MORE ® NO ES TÓXICO EN LA DOSIS RECOMENDADAS.

## INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 20-20-20

Es un fertilizante para múltiples propósitos que presenta una fórmula equilibrada y que usado en el sistema de riego o localizado al suelo permite un adecuado balance de las plantas. Puede ser usado en todos los suelos y cultivos tanto hortícolas, frutales, ornamentales o invernadero.

| CULTIVO                                                                                                                             | DOSIS                   | APLICACIÓN                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Manzano, Peral, Kiwi, Naranja, Pomelo, Limonero, Mandarino, Cerezo, Ciruelo, Nogal, Duraznero, Damasco, Olivo, Uva de mesa y Viñas. | 3-5 Kg/ha               | 1ª aplicación postcuaaja. Repetir cada mes hasta 40 días precosecha.                    |
| Tomates y Hortalizas en general                                                                                                     | 0,5-1 Kg/ 100 L de agua | Primera aplicación 30 días después de trasplante. Repetir mensualmente según necesidad. |
| Frutillas, Frambueso y Arándano                                                                                                     | 3 Kg/ha                 | Aplicar desde fruto formado en adelante y repetir 10 días después.                      |
| Papas                                                                                                                               | 3-5 Kg/ha               | 3-4 hojas en adelante o entre 5 a 10 cm. de altura. Repetir según necesidad.            |

### Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
- Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2-  Harvest More®
- 3- Agroquímico

**Stoller** en su región es:

|                                                     |                                                        |                                                  |                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XV Región<br>Alvaro Villarreal<br>+56 9. 3 224 0339 | III Y IV Región<br>Ulises Pizarro<br>+56 9. 9 534 2016 | V Región<br>Luisa Baeza<br>+56 9. 6 845 3268     | Región Metropolitana<br>Oriana Reyes<br>+56 9. 4 248 8538                    | VI Región<br>Alejandro Guajardo<br>+56 9. 8 916 2012                         |
| VII Región<br>Paula Vargas<br>+56 9. 9 451 4384     | VIII Región<br>Fabian Suescun<br>+56 9. 9 630 6790     | IX Región<br>Camilo Quezada<br>+56 9. 4 010 6875 | XIV y X Región<br>Antonio Villagra<br>+56 9. 9 537 5239                      | Nicolás Torres<br>+56 9. 9 451 4354                                          |
|                                                     |                                                        |                                                  | Jefe Regional Zona Norte<br>(III a VI)<br>Fredy Morales<br>+56 9. 9 451 4385 | Jefe Regional Zona Sur<br>(VII a XIV)<br>Claudio Romero<br>+56 9. 9 161 8424 |



Para consultas técnicas contactarse con él  
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él  
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.

stoller@stoller.cl  
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER PERÚ  
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.  
Importado por STOLLER DE CHILE S.A.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.  
Teléfono +56 (75) 2 314 789

®Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.