



Receso Invernal



Dosis

1,5 Kh/100L de agua

Harvest More®
30-10-10

Antes de Brotación (Brotos de 2-3 cm)



Dosis

1 Lt/100 L de agua

NATUR'L ÓLEO®

Inicio de Brotación



Dosis

2-3 Kg/ha

KEY FEEDS® MICROMIX®

3-5 Lt/ha

FOLI-ZYME®
FORTIFIED

1-2 Lt/ha

ReZist®

Botón Floral



Dosis

100cc/100L de agua (1 Lt/ha)

STIMULATE

+

3 L/ha

SETT®

Repetir entre 30-50% flor y entre 80-100% flor. Dentro de éste mismo estado fenológico hacer la salvedad que entre 30-50% flor aplicar

KEY FEEDS® MICROMIX®

2-3 Kg/ha para nutrición floral.

Fruto Cuajado



Dosis

1,5-2 Lt/ha

X-CYTE®

+

3 Lt/ha

SETT®

Repetir según necesidad a los 7-10 días.

Crecimiento Fruto



Dosis

1,5-2 Lt/ha

X-CYTE®

+

3 Lt/ha

SETT®

+

3-5 Kg/ha

Harvest More®
20-20-20

Quiebre de Color



Dosis

5 Kg/ha

Harvest More®
5-5-45

20 días después aplicar:

5 Kg/ha

Harvest More®
5-5-45

+

4 Lt/ha

SUGAR MOVER®

Repetir a los 10-15 días.

Pre-Cosecha



Dosis

200-300 cc /100L de agua

PHYTOGARD®
Potasio

(Aplicar vía riego)

Repetir según condiciones climáticas

Post-Cosecha



Dosis

2-3 Kg/ha

KEY FEEDS® MICROMIX®

